

Impftermine für Ihr Kind gemäß STIKO-Empfehlungen^(1,2) für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

Impfungen	Alter in Wochen			Alter in Monaten ^(3,4)										Alter in Jahren ^(2,4)						
	0	4	6	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11	J1		J2
Rotaviren				1. Impfung ⁽⁵⁾	2. Impfung	(3. Impfung)														
Grundimmunisierung** – Tetanus ⁽⁶⁾ – Diphtherie ⁽⁶⁾ – Keuchhusten ⁽⁶⁾ – Haemophilus influenzae Typ b (Hib) ⁽⁶⁾ – Kinderlähmung ⁽⁶⁾ – Hepatitis B ⁽⁶⁾				1. Impfung	2. Impfung				3. Impfung ⁽⁹⁾						1. Auffrischung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten		2. Auffrischung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung			
Pneumokokken ^(6,7)				1. Impfung	2. Impfung				3. Impfung ⁽⁹⁾											
Meningokokken B ⁽⁸⁾				1. Impfung	2. Impfung				3. Impfung ⁽⁹⁾											
Grundimmunisierung*** – Masern – Mumps – Röteln – Windpocken									1. Impfung			2. Impfung								
Gebärmutterhalskrebs und andere durch HPV verursachte Tumore																		1. + 2. Impfung ⁽¹⁰⁾		
Meningokokken ACWY ⁽¹²⁾																		1. Impfung		
Respiratorisches Synzitial Virus (RSV)				mAk (Einmaldosis) je nach Geburtsmonat ⁽¹³⁾																

Empfohlener Impfzeitraum Nachholimpfung

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden. – ** möglich mit 6fach-Kombinationsimpfstoff. – *** möglich mit 4fach-Kombinationsimpfstoff bzw. bei 1. Impfung mit MMR- und V-Impfstoff zeitgleich.

1. Gemäß den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO). Quellen: Epidemiologisches Bulletin 04/2025 und Epidemiologisches Bulletin 44/2025. – 2. Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden. – 3. Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres. – 4. Koadministrationsmöglichkeiten vgl. Fachinformation. – 5. Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen. – 6. Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen. – 7. Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft. – 8. Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen. – 9. Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate. – 10. Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich. – 11. Impfung entsprechend Herstellerangaben. – 12. Nachholimpfungen sollten bis zum Alter von < 25 Jahren erfolgen. – 13. Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3. – 10. Lebenstag).

Fremdsprachiges Material zur Impfaufklärung – Ihr praktischer Impfservice:*



**Impfkalender
in 10 Sprachen**
*Vaccination calendar
in 10 languages (RKI)*



6fach Impfung
6-in-1 vaccine



Windpocken-Impfung
Chicken pox vaccine



Tdap-IPV-Impfung
*Combination vaccine:
Tetanus, diphtheria,
whooping cough, polio*



MMR-Impfung
*Combination vaccine:
Measles, mumps, rubella*



Influenza Impfung
Flu vaccine



**Pneumokokken-
Impfung**
Pneumococcal vaccine



Rotaviren-Impfung
Rotaviruses vaccine



Hepatitis-A-Impfung
Hepatitis-A vaccine



**Meningokokken-B-
Impfung**
*Meningococcal B
vaccine*



**Meningokokken-ACWY-
Impfung**
*Meningococcal ACWY
vaccine*



**Humane Papillomviren-
Impfung**
*Human papillomavirus
vaccine*

* Quelle: RKI (www.rki.de)

